

Droge

Brzi test za dokazivanje
6 različitih droga

Droge: tvari koje izazivaju ovisnost te imaju nuspojave

Droge su psihoaktivne tvari koje utječu na ponašanje i raspoloženje dotičnog korisnika. Međutim, konzumaciju jedne ili više droga prate zнатне opasnosti. Dugoročno se mogu očekivati oštećenja tjelesnog zdravlja te pojave psihosocijalnih teškoća kao posljedica moguće ovisnosti.

Otkrijte uzrok svojih tegoba: brzi test za droge

Pomoću brzog testa na uzorku urina mogu se brzo i sigurno dokazati znakovi zloupotrebe **amfetamina, benzodiazepina (sredstva za smirenje), kokaina, marijuane (THC), metadona te opijata**. Test daje informacije o drogama koje su se konzumirale.

Koliko je pouzdan test Veroval®?

Brzi test za droge razvijen je s ciljem da se točnost i sigurnost suvremene dijagnostike učine dostupnima i za privatno korištenje kod kuće. Kod ovog testa radi se o imunokromatografskom analitičkom postupku, koji može dokazati droge, odnosno proizvode njihove razgradnje u urinu. **Osjetljivost izmjerena u studijama za ocjenjivanje izvedbe veća je od 96 %.**

Je li izvođenje testa komplikirano?

Ne: sve što trebate su čisto oprane ruke, sat, čaša i ravna površina stola. Točan tijek testa pronaći ćete na stražnjoj stranici.

Podaci o izvedbi:

Brzi test za droge može paralelno dokazati sljedeće kategorije tvari. Pritom je test uvijek kalibriran s navedenom osjetljivošću (cut-off) na jednog predstavnika tvari:

Test	Kratika	Kalibrator	Cut-off (ng/ml)	Dokazivost u urinu od posljednje konzumacije ¹
amfetamin	AMP	D-amfetamin	1000	1 do 3 dana
benzodiazepin	BZO	oksazepam	300	povremena konzumacija: do 3 dana redovita konzumacija: do 6 tjedana
kokain	COC	benzoilekgonin	300	Kokain se može dokazati samo nekoliko sati, produkt razgradnje 2 do 3 dana
marijuana	THC	11-nor-Δ ⁹ -THC-9 COOH	50	povremena konzumacija: 2 do 4 dana trajna konzumacija: 2 do 6 tjedana
metadon	MET	metadon	300	2 do 3 dana
opijati	OPI	morfij	300	do 8 sati

Povrh kalibratorskih tvari brzi test za droge dokazuje također i druge srodne derivate ili metabolite.

¹Imajte na umu da se radi o grubim približnim vrijednostima. Mnogi pojedinačni čimbenici igraju ulogu u dokazivosti droga u urinu.

5 min.



Osjetljivost
> 96%



Na što moram paziti?

Upozorenja i važne napomene:

- Test je namijenjen isključivo primjeni izvan tijela.
- Ne konzumirajte ni jedan od sastavnih dijelova testa.
- Čuvajte test izvan dohvata djece.
- Ne izlažite test izravnoj sunčevoj svjetlosti ili hladnoći. Ne smrzavati. Skladištiti na suhom mjestu i temperaturi između 4 °C i 30 °C.
- Vlaga i pogrešna temperatura mogu nepovoljno utjecati na rezultate testa.
- Proizvod se smije upotrebljavati samo do otisnutog datuma valjanosti.
- Ako se upute za upotrebu ne slijede detaljno i točno, može doći do lažnih rezultata testa.
- Ne upotrebljavajte test ako je pakiranje oštećeno. Ne koristite oštećene komponente testa.
- Lažno pozitivni rezultati² mogu nastupiti u rijetkim slučajevima (npr. pri konzumaciji određenih namirnica/dodataka prehrani).
- Sve komponente testa namijenjene su samo za upotrebu tijekom izvođenja dotičnog testa. Ne upotrebljavati test ponovno nakon upotrebe!
- Nakon otvaranja folijskog pakiranja test je potrebno zaštитiti od onečišćenja i provesti ga unutar jednog sata od otvaranja.
- Slab vid, neraspoznavanje boja ili nedovoljna osvijetljenost mogu negativno djelovati na ispravno ocjenjivanje testa.
- Uzorci urina mogu biti zarazni. Upotrijebljene testove stoga je potrebno zbrinuti u kućni otpad, a ruke nakon toga temeljito oprati.

Važna napomena:

Pozitivne i nejasne rezultate potrebno je potvrditi dodatnom analitičkom metodom.

²Lažno pozitivan = pogrešno se prikazuje pozitivan rezultat testa iako je rezultat testa zapravo negativan.

www.veroval.hr

Materijali

- 1 testna kazeta u zaštitnoj foliji
- 1 upute za upotrebu

Objašnjenje simbola

	Pridržavati se uputa za upotrebu		+30 °C		Upotrebljivo do (vidjeti otisnuti datum na pakiranju)
	Sadržaj dostatan za 1 testiranje		+4 °C		Ne upotrebljavati ponovno
	Proizvođač				LOT Oznaka serije (vidjeti otisnutu na pakiranju)
			5 min.		Vrijeme reakcije na testnoj kazeti
					Brzi test za osobnu upotrebu

NanoRepo AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg

Prodaja:
HR – PAUL HARTMANN d.o.o.
Karlovacka cesta 4f
10020 Zagreb
info-hr@hartmann.info

Droge

Brzi test za samotestiranje

Test se izvodi na slijedeći način:




Preparacija:

Prije početka testiranja pustite da testna kazeta u folijskom pakiraju postigne sobnu temperaturu (15°C – 27°C). Izvadite test za droge iz folijskog pakiranja.



- Sakupite svježi urin u čašu. U slučaju zamjena u urinu, pričekajte da se ono istaloži.
- Uklonite zaštitnu kapicu i na najmanje 10 sekundi držite test za drogu uronjen u urinu do oznake. Osigurajte da je testna kazeta uronjena samo do donjeg ruba.
- Pripazite da ne dodirujete prozorčić za ocjenjivanje testa te da na njega ne dospije urin.




- Kapicu ponovno nataknite na testnu kazetu te sve zajedno položite na ravnu površinu. Nemojte više doticati niti pomicati testnu kazetu. Pričekajte da se pojave obojene linije u reakcijskom polju.

- Očitajte rezultat nakon približno 5 minuta, ali ne nakon više od 10 minuta.
- Test za droge mora se očitati pri dobrom osvjetljenju kako bi se i slabe obojene linije mogle raspozнати.

Za ocjenjivanje rezultata prvo utvrdite vidi li se po jedna linija u reakcijskom polju ispod (C). Nije bitno koliko je jako ili slabo izražena ta kontrolna linija. Svaku testnu traku potrebno je pojedinačno ocijeniti.


Negativan rezultat



U slučaju negativnog rezultata, dakle **uzorka urina koji ne sadrži droge**, pojavljuju se u reakcijskim poljima **sijelo do tamno crvene testne linije (T)** i **sijelo do tamno crvene kontrolne linije (C)**.

Koncentracija ovih specifičnih droga (ili njihovih derivata) u uzorku leži ispod granične vrijednosti.


Pozitivan rezultat



U slučaju **pozitivnog rezultata**, ne pojavljuju se u reakcijskim poljima **nikakve testne linije (T)** nego samo **sijelo do tamno crvene kontrolne linije (C)**.

Koncentracija ovih specifičnih droga (ili njihovih derivata) u uzorku leži iznad granične vrijednosti. Nisu mogući zaključci o visini koncentracije te time težini konzumacije.

Nevažeći rezultat



Ako u reakcijskim poljima vidite **samo testne linije (T)**, **ne vidite kontrolne linije (C)** ili **ne vidite nikakve linije**, test je **nevažeći**.

Provjerite jeste li točno slijedili sve točke uputa za upotrebu. Provedite novi test s novim uzorkom urina.

Napomene i ograničenja

- Brzi test nije medicinski proizvod te se stoga ne smije primijeniti u dijagnostičke svrhe.
- Test je pozitivan samo ako uistinu **nijedna testna linija (T)** nije vidljiva.
- Namjerno primjenjena sredstva za lažiranje rezultata mogu negativno utjecati na test. U slučaju prepostavljenog lažiranja rezultata potrebno je ponoviti testiranje pomoću novog uzorka urina.
- Ovo samotestiranje ne pravi razliku između zloupotrebe droga i primjene srodnih lijekova koji se izdaju na recept.
- Iako se negativno djelovanje na test može isključiti za široku paletu tvari, ne može se isključiti da rezultat testa ne lažiraju druge tvari te tehničke greške ili greške uvjetovane postupkom.